

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: BREŽICE, za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika | GGE | Količina evidentiranih lubadark v m ³ | Količina saniranih lubadark v m ³ | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------|---------------------------------|----------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| smreka | <i>Pityogenes chalcographus</i> | MOKRICE | 2 | | pada | | | | | | | |
| smreka | <i>Pityogenes chalcographus</i> | PIŠECE | 13 | 43 | pada | | | | | | | |
| smreka | <i>Pityogenes chalcographus</i> | GORJANCI | | 7 | miruje | | | | | | | |
| smreka | <i>Pityogenes chalcographus</i> | MOKRONOG | 34 | 16 | pada | | | | | | | |
| smreka | <i>Pityogenes chalcographus</i> | DOLE | 15 | 1 | pada | | | | | | | |
| smreka | <i>Pityogenes chalcographus</i> | SEVNICA | 17 | 14 | pada | | | | | | | |
| smreka | <i>Pityogenes chalcographus</i> | ŠENTJANŽ | 3 | 3 | pada | | | | | | | |
| smreka | <i>Pityogenes chalcographus</i> | BOHOR | 3 | 1 | pada | | | | | | | |
| smreka | <i>Pityokteines curvidens</i> | STUDENEC | 7 | 7 | pada | | | | | | | |
| smreka | <i>Pityokteines spinidens</i> | GORJANCI | 33 | 33 | pada | | | | | | | |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | MOKRICE | 221 | 234 | pada | | | | 4 | | | |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | PIŠECE | 67 | 209 | pada | | | | 1 | | | |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | GORJANCI | 229 | 264 | pada | | | | 28 | | | |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | KRAKOVO | 91 | 129 | pada | | | | 12 | | | |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | MOKRONOG | 724 | 787 | pada | | | | 64 | | | |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | DOLE | 269 | 359 | pada | | | | 13 | | | |

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika | GGE | Količina evidentiranih lubadark v m ³ | Količina saniranih lubadark v m ³ | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------|------------------------|----------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| smreka | <i>Ips typographus</i> | RADECE | 328 | 316 | miruje | 30 | | 5 | 18 | 4 | 1 | 3 |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | SEVNICA | 122 | 478 | pada | | | | 14 | | | |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | ŠENTJANŽ | 584 | 628 | pada | | | | 24 | | | |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | STUDENEC | 785 | 1.029 | pada | | | | 28 | 3 | 3 | 1 |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | BOHOR | 122 | 129 | pada | | | | 15 | | | |
| smreka | <i>Ips typographus</i> | SENOVO | 75 | 87 | miruje | | | | 2 | | | |
| bori | <i>Ips typographus</i> | MOKRONOG | | 5 | | | | | | | | |
| rdeči bor | <i>Ips sexdentatus</i> | SEVNICA | 3 | 3 | narašča | | | | | | | |
| macesen | <i>Ips cembrae</i> | DOLE | | 15 | | | | | | | | |
| Skupaj | | | 3.745 | 4.797 | | 30 | | 5 | 223 | 7 | 4 | 4 |

Vsote po vrsti podlubnika

| Vrsta podlubnika | Količina evidentiranih lubadark v m ³ | Količina saniranih lubadark v m ³ | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|---------------------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Ips cembrae</i> | | 15 | | | | | | | | |
| <i>Ips sexdentatus</i> | 3 | 3 | | | | | | | | |
| <i>Ips typographus</i> | 3.616 | 4.654 | | 30 | | 5 | 223 | 7 | 4 | 4 |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> | 87 | 84 | | | | | | | | |
| <i>Pityokteines curvidens</i> | 7 | 7 | | | | | | | | |
| <i>Pityokteines spinidens</i> | 33 | 33 | | | | | | | | |

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

