

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: BLED, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	JELOVICA	101	101	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	KRANJSKA GORA	7	7	pada							
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	MEŽAKLA	17	17	pada							
smreka	<i>Ips typographus</i>	NOTRANJI BOHINJ	2.366	2.524	narašča				3	3	3	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	JELOVICA	15.105	17.147	pada				13	4	4	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	MEŽAKLA	5.208	5.208	pada				9	2	0	2
smreka	<i>Ips typographus</i>	POKLJUKA	10.372	10.399	pada	168			7	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	KRANJSKA GORA	12.404	12.169	pada				12	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	JESENICE	4.049	3.917	narašča				8	3	3	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	ŽIROVNICA	1.336	1.875	narašča				3	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2.076	2.960	pada				6	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	7.793	8.450	pada				8	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	BLED	2.302	2.372	narašča	10			6	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	BOHINJ	4.729	4.351	narašča				16	8	7	1
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	NOTRANJI BOHINJ	32	32								
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	JELOVICA	46	50	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	POKLJUKA	4	7								
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	KRANJSKA GORA	13	12	pada							

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	BOHINJ	4	4	pada							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	KRANJSKA GORA		6	miruje							
jelka	<i>Ips typographus</i>	JELOVICA	14	14	pada							
jelka	<i>Ips typographus</i>	KRANJSKA GORA	1	1	pada							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE		3	miruje							
macesen	<i>Pityokteines curvidens</i>	KRANJSKA GORA	3	1								
macesen	<i>Ips typographus</i>	RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	3	3								
macesen	<i>Ips cembrae</i>	KRANJSKA GORA	2	0								
veliki jesen	<i>Leperesinus fraxini</i>	RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE		17	miruje							
Skupaj			67.988	71.647		178			91	24	20	4

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Ips cembrae</i>	2	0								
<i>Ips sexdentatus</i>		3								
<i>Ips typographus</i>	67.758	71.390		178			91	24	20	4
<i>Leperesinus fraxini</i>		17								
<i>Pityogenes chalcographus</i>	109	108								
<i>Pityokteines curvidens</i>	119	123								
<i>Pityokteines spinidens</i>		6								

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Odar Lucija

Datum: 03.02.2026