

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: KRANJ, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	TRŽIC		2	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	CERKLJE	62	53	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	ŽELEZNIKI	28	43	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	ŠKOFJA LOKA	16	7	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	POLJANE		5	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	SOVODENJ	16	31	pada							
smreka	<i>Ips typographus</i>	JELENDOL	3.167	3.056	narašča				8	4	3	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	TRŽIC	2.865	3.112	pada				15	5	4	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	KOKRA	2.708	2.225	narašča				4	3	2	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	JEZERSKO	5.235	6.338	pada				9	3	3	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	PREDDVOR	1.417	1.743	pada				14	2	2	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	CERKLJE	6.272	6.712	pada				22	6	4	2
smreka	<i>Ips typographus</i>	BESNICA	4.450	5.572	pada				10	5	4	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	ZALI LOG	3.502	4.018	narašča				10	4	3	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	ŽELEZNIKI	4.431	4.956	pada				11	7	6	2
smreka	<i>Ips typographus</i>	SELCA	5.202	5.197	pada	11		11	9	8	6	2
smreka	<i>Ips typographus</i>	ŠKOFJA LOKA	4.191	5.522	pada				15	5	4	1

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Ips typographus</i>	POLJANE	7.790	8.907	pada				10	10	8	2
smreka	<i>Ips typographus</i>	SOVODENJ	3.551	3.887	pada				10	5	4	1
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	ŽELEZNIKI	5	5	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	TRŽIC	8	8	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	PREDDVOR	124	124	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	ŽELEZNIKI	22	20	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	SELCA	19	24	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	POLJANE		5	miruje							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	CERKLJE	12	12	pada							
jelka	<i>Ips typographus</i>	SELCA	2	2	pada							
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	PREDDVOR		1	miruje							
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	CERKLJE	21	26	pada							
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	BESNICA	1		pada							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	PREDDVOR	2	2	pada							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	SELCA	3		narašča							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	POLJANE	2	2	narašča							
Skupaj			55.124	61.618		11		11	147	67	52	15

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Cryphalus piceae</i>	5	5								
<i>Ips sexdentatus</i>	7	4								
<i>Ips typographus</i>	54.805	61.274		11		11	147	67	52	15
<i>Pityogenes chalcographus</i>	122	142								

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Pityokteines curvidens</i>	173	181								
<i>Pityokteines spinidens</i>	12	12								

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šesterozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Rozman Jurij

Datum: 03.02.2026