

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: NAZARJE, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	LUCE	3	3	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	LJUBNO	69	35	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	GORNJI GRAD	501	504	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	NAZARJE	13	13	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	BELE VODE	70	100	pada							
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	LJUBNO	16	9	pada							
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	GORNJI GRAD	49	49	pada							
smreka	<i>Ips typographus</i>	SOLCAVA	3.391	3.339	pada				6	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	LUCE	3.469	3.593	pada				10	3	3	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	LJUBNO	3.317	3.371	pada				39	7	7	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	GORNJI GRAD	6.015	6.033	pada				32	19	17	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	NAZARJE	4.152	4.754	pada				19	2	1	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	BELE VODE	3.073	3.331	pada				25	1	0	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	VELENJE	3.197	3.176	pada				25	2	1	1
smreka	<i>Xyloterus lineatus</i>	LJUBNO	41	41	pada							
smreka	<i>Xyloterus lineatus</i>	GORNJI GRAD	13	13	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	LJUBNO	10	8								

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	GORNJI GRAD	20		pada							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	LUCE	1	1	pada							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	LJUBNO	10	10								
jelka	<i>Ips typographus</i>	NAZARJE	4		pada							
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	LJUBNO	2	2								
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	NAZARJE	80	80	narašča							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	LUCE	6	6								
Skupaj			27.522	28.472					156	34	29	5

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Ips sexdentatus</i>	6	6								
<i>Ips typographus</i>	26.700	27.679					156	34	29	5
<i>Pityogenes chalcographus</i>	656	655								
<i>Pityokteines curvidens</i>	95	66								
<i>Pityokteines spinidens</i>	11	11								
<i>Xyloterus lineatus</i>	55	55								

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Denša Marijan

Datum: 03.02.2026