

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: NOVO MESTO, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka		ŽUŽEMBERK		5	miruje					0	0	0
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	NOVO MESTO-JUG	21	21	pada					0	0	0
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	NOVO MESTO-SEVER	1	1	pada					0	0	0
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	ŠENTJERNEJ	9	9	pada					0	0	0
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	STRAŽA-TOPLICE	13	13	pada					0	0	0
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	TREBNJE II	186		pada					0	0	0
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	CRNOMELJ		5	miruje					0	0	0
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	TREBNJE I	18	18	pada					0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	NOVO MESTO-JUG	3.634	3.352	pada				6	5	4	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	NOVO MESTO-SEVER	4.061	3.932	pada				1	5	4	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	ŠENTJERNEJ	684	714	pada				2	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	STRAŽA-TOPLICE	2.374	2.335	pada				3	2	2	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	ŽUŽEMBERK	5.966	5.874	miruje				5	5	4	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	KRKA	3.407	3.270	pada				4	3	3	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	BREZOVA REBER	2.897	2.897	miruje				2	2	2	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	SOTESKA	1.633	1.633	pada				2	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	POLJANE	7.958	7.971	pada				1	7	7	0

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Ips typographus</i>	CRMOŠNJICE	3.214	3.215	pada				6	3	2	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	MIRNA GORA	1.284	1.245	pada				4	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	SEMIC	450	546	pada				5	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	METLIKA	1.477	1.665	pada				5	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	TREBNJE I	20.133	19.239	narašča				1	10	8	2
smreka	<i>Ips typographus</i>	TREBNJE II	3.693	5.153	pada				2	3	2	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	CRNOMELJ	2.577	2.641	miruje				6	2	2	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	STARI TRG	207	222	pada				4	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	ADLEŠICI	1.432	1.314	pada				7	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	MEHOVO	2.927	2.939	pada				2	3	2	1
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	CRNOMELJ	3									
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	NOVO MESTO-JUG	11	11								
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	NOVO MESTO-SEVER	5		pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	STRAŽA-TOPLICE	45	41	miruje							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	BREZOVA REBER	19	19	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	SOTESKA	25	25								
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	CRMOŠNJICE	46	46	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	STARI TRG	9	9								
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	NOVO MESTO-JUG	0									
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	MIRNA GORA	31	31								
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	STARI TRG	7									
jelka	<i>Ips typographus</i>	NOVO MESTO-JUG	11									
jelka	<i>Ips typographus</i>	STRAŽA-TOPLICE	3	3	pada							
jelka	<i>Ips typographus</i>	ADLEŠICI	6									
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	NOVO MESTO-JUG	1	1								
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	NOVO MESTO-SEVER	1	2								

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	NOVO MESTO-SEVER	1									
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	KRKA	44	44	narašča							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	TREBNJE II	2	2								
zeleni bor	<i>Tomicus piniperda</i>	METLIKA	4									
zeleni bor	<i>Ips typographus</i>	NOVO MESTO-JUG		5	miruje							
zeleni bor	<i>Ips sexdentatus</i>	NOVO MESTO-JUG	25		pada							
veliki jesen	<i>Leperesinus fraxini</i>	STRAŽA-TOPLICE	4	4								
Skupaj			70.558	70.471					68	51	43	8

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Cryphalus piceae</i>	3									
<i>Ips sexdentatus</i>	71	45								
<i>Ips typographus</i>	70.031	70.168					68	51	43	8
<i>Leperesinus fraxini</i>	4	4								
<i>Pityogenes chalcographus</i>	230	49						0	0	0
<i>Pityokteines curvidens</i>	178	169						0	0	0
<i>Pityokteines spinidens</i>	38	31								
<i>Tomicus piniperda</i>	4									

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

