



## GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Večna pot 2, 61000 Ljubljana, p.p. 523-X, Slovenija  
 telefon: 386 61 + 1231343  
 telefax . 386 61 + 273589

Poročevalska, diagnostična in prognostična  
 služba za varstvo gozdov  
 GIS in Oddelek za gozdarstvo BF  
 Ljubljana

Ljubljana, 18. 5. 1995

Zavod za gozdove Slovenije  
 Območna enota Bled  
 Ga. Vida Papler-Lampe, dipl. inž. gozd.  
 Vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov  
 Ljubljanska cesta 19  
 Bled

Zadeva: Podlubniki in hiranje ruševja na Pokljuki

I. V četrtek, 28. 3. 1996 smo si ogledali poškodovane sestoje na Pokljuki: Vida Papler-Lampe, vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov OE Bled, Miro Kapus, vodja krajevnih enot Pokljuka, Tone Smukavec, vodja krajevnih enot Bohinj, Lojze Butkovič, revirni vodja, Marko Gašperin, gojitelj-načrtovalec v krajevni enoti Bohinj, prof. dr. Janez Titovšek, Gozdarski oddelek BF in mag. Dušan Jurc, Gozdarski inštitut Slovenije.

V prostorih revirnega vodstva na Mrzlem studencu smo bili prisotni seznanjeni s stanjem napada lubadarjev v revirju Pokljuka. Predložena je bila karta revirja z vrisanimi aktualnimi žarišči. Število žarišč in njihova distribucija kažeta, da je populacijski nivo lubadarjev še vedno višji od normalnega in, da bo potrebno intenzivirati ukrepe za znižanje njihove gostote. Po kratki diskusiji smo se prisotni podali na teren in si od daleč ogledali dve žarišči ter ugotovili:

1. Kljub snežni odeji, ki lahko na mraziščnih lokacijah skopni šele maja ali celo v prvi polovici junija, je potrebno do zakonsko postavljenega roka, v kolikor pa to zaradi izjemnih vremenskih razmer ni mogoče, pa čim prej, posekati vse lubadarke. Tako bi preprečili zgodnji nastop rojenja tistemu delu populacije lubadarjev, ki prezimujejo na lubadarkah in ki ga tudi sicer ni mogoče v zadostni meri zvažiti na lovne nastave in v lovne pasti. Zgodnji nastop rojenja lubadarjev v krošnjah in zavrtavanje v bližnje smreke pospešuje direktna sončna insolacija s pregrevanjem lubja na eksponiranih delih debel.

Za izdelavo lubadark in uničenje lubadarjev je potrebno pripraviti terenski načrt in pri tem upoštevati lokalne klimatske razmere. Razume se, da imajo prednost pri izdelavi lubadarke, ki so bile posekane na eksponiranih legah.

2. V izjemnih primerih, ko je potrebno izvesti sečnjo v ožjem območju še nesaniiranega večjega žarišča lubadarjev kjer nastopajo le-ti v zvišani gostoti populacije, je smotrno in smiselno sečne

ostanke požgati, da bi tako zmanjšali realno trofično kapaciteto in preprečili potencialno nevarnost razširitve žarišč oziroma skrajšali čas sanacije. V normalnih razmerah pa požig sečnih ostankov tudi v požarno neogroženih gozdovih ni smotrn in je bil s podzakonskimi akti prejšnjega zakona o gozdovih tudi prepovedan.

II. Že avgusta 1995 ste prinesli vzorce iglic ruševja (*Pinus mugo* Turra) iz barja Šijec na Pokljuki. Makroskopski simptomi so kazali na močno okuženost iglic z rdečerjavo progavostjo borovih iglic, ki jo povzroča gliva *Dothistroma pini* Hulbary (teleomorf je *Scirrhia /Mycosphaerella/ pini* Funk & Parker), kar smo vam povedali takoj, ko ste prinesli vzorce. Vendar smo ob mikroskopskem pregledu vzorcev (pozimi 1996) opazili, da simptomi niso v popolnosti enaki tipični bolezni in bi jih lahko povzročila njena sorodnica *Dothistroma acicola* (Thum.) Schischina & Tzanava. To pa je karantenska bolezen, ki se vse česče pojavlja v Evropi. Od dokaj pogoste *D. pini* se loči predvsem po trosih, ki so debelejši in obarvani. Zato moramo dobiti zrela trosišča, ki jih na vzorcih iz leta 1995 ni. Te bomo nabrali ob letošnjem delu na raziskovalni ploskvi blizu barja Šijec in vam bomo sporočili rezultate.

Sestavila :

I. prof. dr. Janez Titovšek



II. mag. Dušan Jurc